

цовъ 3.038 д. (151,9 д. на 1 вл.), умѣщанъ 1.464 д. (19,8 д. на 1 вл.). Казнъ и др. учрежд. принадл. 36,8% всей площаи. Въ составѣ населен. 40% инородцевъ, гл. обр. чуваши, затѣмъ татары и мордва. Въ уѣздѣ развито промышл. садоводство. Б. Д.

**Курмышъ**, уѣздный городъ Симбирск. г., на лѣв. бер. Суры, 2.775 ж.; женск. гимн. К. основанъ въ 1372 г., какъ пограничный съ ордой сторожевой пунктъ Нижегородск. княжества; въ Смутное время сталъ на сторону Самозванца; сильно пострадалъ во время бунта Разина и Пугачева. У. гор. съ 1780 г.

**Курнід** (Cournot), Антонъ Огюстенъ (1801—1877), съ 1834 г. сост. проф. матем. въ ліонскомъ факультетѣ физ.-мат. наукъ, съ 1835 г. ректоромъ гренобльской академіи, потомъ (1854—62) и дижонской акад. Многочисленные труды К. относятся къ области мат., полит. экон. и философіи. Въ 1838 г. К. издалъ соч. „*Recherches sur les principes mathématiques de la théorie des richesses*“, представляющее первую солидную попытку приложить матем. методъ къ полит. экон., и именно къ тѣмъ только явленіямъ, которыхъ поддаются непосредственному числовому определенію—къ цѣнамъ и доходамъ. Для статистич. теоріи массовыхъ явленій имѣть значит. интересъ его соч. „*Exposition de la théorie des chances et probabilités*“ (1843). Въ его филос. соч. также содержится много цѣннаго для обществ. науки, напр., его теорія случая, какъ положит. элемента въ явленіяхъ, возникающаго вслѣдствіе параллельного существованія многихъ, независящихъ другъ отъ друга рядовъ причинъ.

**Куровъ**, посадъ новоалександрийск. у. Люблинск. г., 5.938 ж.

**Курокъ**, часть ружейнаго замка, служаща для разбивки пистона; см. *оружие*.

**Куропатка**, названіе многихъ видовъ птицъ изъ сем. фазановъ. Къ роду *Perdix* принадлежитъ одинъ изъ самыхъ обыкновенныхъ видовъ, сѣрая К., *P. cinerea*, достигаетъ 32 см. длины. Опереніе самца на всей верхней сторонѣ спины, шеи, груди и боковъ пепельно-сѣре съ черными волнистыми попе-

речными линіями; лобъ, горло и прилегающая часть шеи красиваго охристаго цвѣта; брюхо бѣлое съ сѣроватыми пестринками и большими ржавчато-бурыми пятнами на срединѣ брюха близъ груди. Окраска самки грязнѣе, но въ общемъ похожа на окраску самца. Этотъ видъ широко распространенъ въ Европѣ и Азіи, поднимаясь въ Европѣ до полярного круга. К.—въ общемъ довѣрчивая птица, быстро размножается, предпочитаетъ поля, поросшія кустарникомъ и мелко-лѣсью, отлично бѣгаєтъ, превосходно роется въ землѣ, летаетъ быстро и сильно; любимый кормъ—гречиха и просо, но К. есть и другіе хлѣба, сѣмена сорныхъ травъ и насѣкомыхъ. Внѣ брачнаго периода К. живутъ стаями, но весной разбиваются на пары, гнѣздятся въ маѣ; самка откладываетъ отъ 12—24 яицъ, длиной до 3,5 см.; уходъ за выводкомъ принадлежитъ обоимъ родителямъ. Зимой вслѣдствіе недостатка корма К. приближаются къ жилищамъ человѣка, залетаютъ на гумна и здѣсь ловятся во множествѣ; на ночь забираются въ снѣгъ и въ случаѣ оттепели и затѣмъ заморозковъ нерѣдко не въ состояніи выбраться наружу и погибаютъ. У тундряной К. (горнаго тетерева), *Lagopus mutus*, зимнее опереніе чисто-бѣлое, хвостъ черный. Весной часть перьевъ не смѣняется, а другая дѣлается черной съ охристо-бурыми пестринами; осенью—окраска сѣрая съ чернымъ. Такъ какъ вторая линька начинается до окончанія первой, то на птицѣ можно найти перья трехъ разныхъ нарядовъ. Тундрян. К. распространена по сѣверу Европы, Азіи и Сѣв. Америки и является т. обр. кругополярной птицей. К. бѣлая, или альпійская, *L. albus*, отличается сплошнымъ опереніемъ ногъ и сезонной смѣной оперенія (иногда до 3 разъ въ годъ). Въ зимнемъ нарядѣ она похожа на предыдущій видъ, весной, сохранившая часть перьевъ (низъ груди, брюхо, ноги), принимаетъ темно-ржавобурую окраску, болѣе свѣтлую у самки. Распространена тамъ же, где и тундряная К. Вкусное мясо и многочисленность описанныхъ К. дѣлаютъ ихъ повсюду важными промысловыми птицами. Меньшее распространение имѣютъ